



Orale beschermende gel bij mucositis: verlicht de pijn

Productbeschrijving

Gelclair® is een dikvloeibare gel speciaal ontwikkeld om de pijnlijke symptomen van ontstoken slijmvlies in de mond te verlichten. Het vormt een beschermende filmlaag die aan het mondslijmvlies plakt waardoor verdergaande beschadiging niet optreedt en zo zorgt voor een snelle verlichting van de pijn.

Gelclair® is een geconcentreerde orale gel, voor gebruik eerst verdunnen met water.

Indicaties

Gelclair® verlicht de pijnlijke symptomen van ontstoken slijmvlies in de mond. Gelclair®, gebruikt als mondspoeling, vormt een beschermende filmlaag die zorgt voor het verlichten van de pijn en het verzachten van beschadigingen in de mond. Deze beschadigingen hebben verschillende oorzaken waaronder medicatie, ziekte, bestraling, chemotherapie, operaties in de mond, traumatische zweren veroorzaakt door beugels of slechtzittende kunstgebitten en veroudering

Ingrediënten

AQUA, PVP, MALTODEXTRIN, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, AROMA, DISODIUM EDTA, SODIUM HYALURONATE, SODIUM SACCHARIN, GLYCYRRHETINIC ACID, PRESERVATIVES (POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZALKONIUM CHLORIDE)

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik Gelclair® 3 maal daags of als het nodig is.

Giet de volledige inhoud van een zakje Gelclair® in een glas en voeg ongeveer 40ml water (3 eetlepels) toe.

Roer het mengsel goed door en gebruik direct.

Spoel de mond gedurende tenminste 1 minuut of zolang mogelijk om de tong, het gehemelte, de keel, de binnenkant van de wangen en ander mondweefsel grondig te bedekken.

Gorgel en spuug uit.

Wacht met eten en drinken gedurende 1 uur na behandeling.

Gooi overgebleven mondspoeling weg.

Niet inslikken.

Bij patiënten die niet kunnen spoelen en gorgelen (bv jonge kinderen) kan Gelclair® direct in de mond worden aangebracht met behulp van een sponsje of wattenstaafje.

Houd buiten bereik van kinderen.

Contra-indicaties

Gelclair® mag niet worden gebruikt bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor een van de ingrediënten.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Er zijn geen interacties met medicinale of andere producten bekend. Theoretisch kan Gelclair® de opname van geneesmiddelen onder de tong (zogenaamd sublinguale toediening) verminderen. Neem contact op met uw behandelend arts indien u naast Gelclair® ook een geneesmiddel onder de tong gebruikt.

Vermijd te eten of drinken gedurende 1 uur na gebruik.

Gebruik Gelclair® niet als het zakje niet meer intact is.

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum aangegeven op de doos en zakje.

De gel kan na verloop van tijd een enigszins donkerder en dikker worden, maar dit heeft geen invloed op de effectiviteit of veiligheid.

Bewaar op kamertemperatuur, buiten direct zonlicht

Wanneer er na 7 dagen geen verbetering is waargenomen, raadpleeg dan een arts.

De behandeling moet na 4 weken worden onderbroken.

Het product mag tijdens zwangerschap en indien borstvoeding wordt gegeven worden gebruikt.

Gelclair® heeft geen effect op het vermogen om auto te rijden of machines te besturen.

Niet inslikken.

Houd buiten bereik van kinderen.

Bijwerkingen

Op dit moment zijn geen nadelige effecten bekend. Het gebruik van het product wordt niet aangeraden bij mensen die overgevoelig zijn voor 1 van de ingrediënten.

Overdosering

Op het moment dat deze bijsluiter werd gemaakt, waren er geen gevallen van overdosering gemeld.

Ondanks het feit dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn bij het doorslikken van Gelclair®, wordt doorslikken afgeraden.

Verpakking

Een Gelclair® verpakking bevat 21 zakjes van 15ml. Voor gebruik eerst verdunnen met water.



CE 0123  **HELSINN**

Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9, 6912 Pazzallo-Lugano, Zwitserland

Distributeur voor Nederland:

TwinPharma BV, postbus 2090, 3440 DB Woerden
www.twinpharma.com en www.gelclair.nl

Datum van laatste wijziging: september 2009



1 550772 621150 >



TwinPharma

Artikel 15507726

GS0103012009